

### Інформаційний лист щодо властивостей компонентів дієтичної добавки

## ВІТРУМ® ПРЕНАТАЛ ПЛЮС/VITRUM® PRENATAL PLUS

Комплекс вітамінів та мінералів для жінок під час вагітності та у період годування груддю

Назва: дієтична добавка ВІТРУМ® ПРЕНАТАЛ ПЛЮС / VITRUM® PRENATAL PLUS

1 таблетка масою 1470 мг (mg) містить:

Вітамін А	0,86 мг (mg)	D-біотин	30,0 мкг (µg)
Бета-каротин (20%)	1,5 мг (mg)	Пантотенова кислота	7,0 мг (mg)
Вітамін В <sub>1</sub>	3,0 мг (mg)	Йод	150,0 мкг (µg)
Вітамін В <sub>2</sub>	3,4 мг (mg)	Кальцій	200,0 мг (mg)
Вітамін В <sub>3</sub>	20,0 мг (mg)	Магній	25,0 мг (mg)
Вітамін В <sub>6</sub>	3,0 мг (mg)	Залізо	32,0 мг (mg)
Вітамін В <sub>12</sub>	4,5 мкг (µg)	Мідь	2,0 мг (mg)
Вітамін D <sub>3</sub>	10,0 мкг (µg)	Цинк	18,0 мг (mg)
Вітамін Е	30,0 мг (mg)	Марганець	3,3 мг (mg)
Вітамін С	120,0 мг (mg)	Селен	25,0 мкг (µg)
Фолієва кислота	400,0 мкг (µg)	Хром	25,0 мкг (µg)

**Склад:** кальцію карбонат, наповнювач - мікрокристалічна целюлоза, аскорбінова кислота, заліза фумарат, DL-альфа-токоферолу ацетат, стабілізатор - стеаринова кислота, магнію оксид, стабілізатор - кроскармелоза натрію, оболонка таблетки OraDry II White (стабілізатор - гідроксипропілметилцелюлоза, барвник - титану діоксид, наповнювач - полідекстроза, антиспаюючий агент - тальк, мальтодекстрин, середньоаланциогові тригліцериди), стабілізатор - кремнію діоксид, цинку оксид, нікотинамід, стабілізатор - магнію стеарат, марганцю сульфат моногідрат, D-пантотенат кальцію, бета-каротин, ретинолу ацетат, фолієва кислота, холекальциферол, піридоксину гідрохлорид, тіаміну нітрат, рибофлавін, D-біотин, хрому хлорид, міді оксид, калію йодид, натрію селенат, ціанокобаламін.

### Науково підтвержені властивості вітамінів та мінералів\*.

**Вітамін А** сприяє покращенню зору та структури шкіри.

**Вітаміни В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>** необхідні для функціонування нервової та серцево-судинної систем. Впливають на білковий, жировий та вуглеводний обмін, зір та ріст.

**Вітамін С** бере участь в окисно-відновних процесах, формуванні кісткової та інших тканин, впливає на згортання крові.

**Вітамін D<sub>3</sub>** разом з кальцієм та фосфором сприяє формуванню кісткової тканини.

**Вітамін Е** впливає на кровотворення, формування м'язової та інших тканин, протидіє ускладненням вагітності (невиношуванню, токсикозам та плацентарній недостатності).

**Йод** є складовою гормонів щитоподібної залози, які беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі та мають важливе значення для нормального формування нервової системи плода і дитини після народження.

**Фолієва кислота** знижує ризик виникнення вроджених вад розвитку у дітей.

**Мікроелементи** впливають на засвоєння вітамінів і нормалізують обмін речовин.

**Рекомендації до споживання:** може бути рекомендована лікарем в доповнення до раціону харчування жінок під час вагітності для запобігання нестачі вітамінів та мінеральних речовин, а також зниження ризику розвитку гіповітамінозів та нестачі мінеральних речовин у період годування груддю.

**Збалансоване харчування - основа нормального розвитку Вашої дитини та перебігу вагітності.**

**Застереження до споживання:** не слід споживати вагітним жінкам або жінкам, що годують груддю, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту.

Жінкам, що мають захворювання щитоподібної залози, слід проконсультуватися з лікарем-ендокринологом.

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замітник різних дієт. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед споживанням обов'язкова консультація лікаря.

**Не є лікарським засобом.**

**Спосіб вживання та рекомендована добова доза:** вагітним та жінкам, що годують груддю, по 1 таблетці на добу під час прийому їжі, запиваючи склянкою води.

**Тривалість споживання:** узгоджувати з лікарем.

**Форма випуску:** таблетки, вкриті плівковою оболонкою, масою 1470 мг (mg).

**Умови зберігання:** зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 60%.

**Строк придатності:** 2 роки від дати виробництва.

**Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів):** ТОВ «АСІНО УКРАЇНА», Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, тел.: +38 (044) 281-23-33.

**Найменування та місцезнаходження виробника:** «Гл Нутрішюналс, Інк.», 111 Коммерс Роуд, Карлштадт, NJ 07072, США.

**Найменування та місцезнаходження пакувальника:** «Юніфарм, Інк.», 75 Прогресс Лейн, Вотербурі, Коннектікут (СТ) 06705, США.

\* Літературні джерела:

1. World Health Organization/Food and Agriculture Organization. Vitamin and mineral requirements in human nutrition, 2nd ed.: WHO/FAO, 2004.
2. European Food Safety Authority (2006) Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals by the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) and Scientific Committee on Food (SCF). Parma: European Food Safety Authority.

