

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства**  
**охорони здоров'я України**  
**25.05.2017 № 564**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/2593/03/01**

**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
**Наказ Міністерства**  
**охорони здоров'я України**  
**09.09.2020 № 2069**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**КСЕФОКАМ® РАПІД**  
**(XEFOCAM® RAPID)**

***Склад:***

*діюча речовина:* lornoxicam; 1 таблетка містить 8 мг лорноксикаму.

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

**Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Оксиками. Код АТХ M01A C05.

***Фармакологічні властивості.***

Лорноксикам є нестероїдним протизапальним засобом з анальгезивними властивостями і належить до класу оксикамів. Механізм дії лорноксикаму в основному ґрунтується на інгібуванні синтезу простагландинів (інгібування циклооксигенази), що спричиняє десенсибілізацію периферичних больових рецепторів та інгібування запалення. Також передбачається центральний вплив на ноцицептори, який не пов'язаний з протизапальною дією.

***Показання.***

Короткочасне лікування гострого болю легкого та помірного ступеня.

***Протипоказання.***

- Гіперчутливість до лорноксикаму або до інших компонентів препарату;
- тромбоцитопенія;
- підвищена чутливість (симптоми, подібні до симптомів при бронхіальній астмі, риніті, ангіоневротичному набряку або кропив'янці) до інших нестероїдних протизапальних засобів, включаючи ацетилсаліцилову кислоту;
- тяжка форма серцевої недостатності;
- шлунково-кишкові кровотечі, церебрально-судинні кровотечі або інші гематологічні порушення;
- шлунково-кишкові кровотечі або перфорації в анамнезі, пов'язані з попереднім прийомом нестероїдних протизапальних засобів;
- активна пептична виразка або рецидиви пептичної виразки/ кровотечі в анамнезі (два або більше доведених епізодів виникнення виразки або кровотечі);

- тяжка форма печінкової недостатності;
- тяжка форма ниркової недостатності (рівень сироваткового креатиніну > 700 мкмоль/л);
- III триместр вагітності (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).

***Побічні реакції.***

Легкий короткочасний головний біль, запаморочення, нудота, біль у животі, диспепсія, діарея, блювання (розділ скорочено, для детальної інформації див. інструкцію для медичного застосування).

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина/ Takeda GmbH Betriebsstätte Oranienburg, Germany.